

Exérèse des lésions précancéreuses : tolérance zéro

Excision of precancerous lesions: zero tolerance

Didier GAUZERAN

Résumé

Devant une lésion de la muqueuse orale suspecte, car présentant des signes cliniques évoquant un potentiel de transformation maligne, la prise en charge devra être rapide et rigoureuse.

En premier lieu, une biopsie sera réalisée selon les normes reconnues.

Dans un deuxième temps, que le résultat de l'examen anatomopathologique soit négatif ou révèle une dysplasie, l'exérèse de la lésion sera réalisée selon un protocole chirurgical carcinologique strict.

La surveillance à distance de l'ensemble des muqueuses orales du patient sera de rigueur.

Mots clefs : Lésions orales potentiellement malignes , Protocole chirurgical carcinologique

Dr Didier Gauzeran

Praticien Hospitalier - chef de service honoraire des Hôpitaux de Paris

Membre titulaire de la Société Française de Chirurgie Orale et de l'Académie Nationale de Chirurgie Dentaire Ancien Expert auprès de l'Institut National du Cancer

Faced with a lesion of the oral mucosa that looks suspicious, presenting clinical signs suggesting a potential for malignant transformation, the patient should be taken care of in a fast and rigorous manner.

First, a biopsy must be performed in accordance with recognized standards.

In a second step, whether the result of the anatomopathological examination is negative or, all the more so if it reveals dysplasia, the excision of the lesion will be carried out following a strict oncological surgical protocol.

Regular monitoring of all of the patient's oral mucosa will be required.

Keys words

Potential for malignant transformation oral lesions

Oncological surgical protocol